

Mygept®

Rimegepant

Orally Disintegrating Tablet (ODT)

Read this leaflet carefully before you start taking Mygept®. This leaflet provides answers to the most common questions. If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist. This medicine has been prescribed for your current illness only. Do not take it in similar conditions and do not pass it on to others. The information in this leaflet was last updated on the date listed at the bottom of the page. More recent information on the medicine may be available. You should ensure that you speak to your doctor or pharmacist to obtain the most up-to-date scientific information on the medicine. The latest version of this leaflet is available on www.nanoalvand.com.

What is in this leaflet

1. What Mygept® is and what it is used for
2. What you need to know before you take Mygept®
3. How to take Mygept®
4. Possible side effects
5. How to store Mygept®
6. Contents of the pack and other information

1. What Mygept® is and what it is used for

Mygept® contains the active substance rimegepant, that stops the activity of a substance in the body called calcitonin gene-related peptide (CGRP). People with migraine may have increased levels of CGRP. Rimegepant attaches to the receptor for CGRP, reducing the ability of CGRP to also attach to the receptor. This reduces the activity of CGRP and has two effects:

- 1) it can stop an active migraine attack
- 2) it can decrease the number of migraine attacks that occur when taken preventively.

Mygept® is used to treat and prevent migraine attacks in adults.

Mygept® is designed as an oral disintegrating tablet (ODT) that dissolves immediately in the mouth and can be swallowed easily without the need for water or food.

2. What you need to know before you take Mygept®

Do not take Mygept®

- if you are allergic to rimegepant or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Mygept®, if any of the following applies to you:

- if you have severe liver problems
- if you have reduced kidney function or are on kidney dialysis

During treatment with Mygept®, stop taking this medicine and tell your doctor immediately:

- if you experience any symptoms of an allergic reaction, e.g., trouble breathing or severe rash. These symptoms can occur several days after administration.

Children and adolescents

Mygept® should not be given to children and adolescents under 18 years of age because it has not yet been studied in this age group.

Other medicines and Mygept®

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. This is because some medicines may affect the way Mygept® works or Mygept® may affect how other medicines work.

The following is a list of examples of medicines that should be avoided when taking Mygept®:

- itraconazole and clarithromycin (medicines used to treat fungal or bacterial infections)
- ritonavir and efavirenz (medicines used to treat HIV infections)
- bosentan (a medicine used to treat high blood pressure)
- St. John's Wort (an herbal preparation used to treat depression)
- phenobarbital (a medicine used to treat epilepsy)
- rifampin (a medicine used to treat tuberculosis or brucellosis)
- modafinil (a medicine used to treat narcolepsy)

Do not take Mygept® more than once every 48 hours with:

- fluconazole and erythromycin (medicines used to treat fungal or bacterial infections)
- diltiazem, quinidine, and verapamil (medicines used to treat an abnormal heart rhythm, chest pain (angina) or high blood pressure)
- cyclosporin (a medicine used to prevent organ rejection after an organ transplant)

Pregnancy and breast-feeding

Pregnancy

If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

It is preferable to avoid the use of Mygept® during pregnancy as the effects of this medicine in pregnant women are not known.

Breast-feeding

If you are breast-feeding or are planning to breast-feed, talk to your doctor or pharmacist before using this medicine. You and your doctor should decide if you will use Mygept® while breast-feeding.

Driving and using machines

Mygept® is not expected to affect your ability to drive or use machines.

3. How to take Mygept®

Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to take

- For prevention of migraine, the recommended dose is one ODT (75 mg rimegepant) every other day.
- For treatment of a migraine attack once it has started, the recommended dose is one ODT (75 mg rimegepant) as needed, not more than once daily.

The maximum daily dose is one oral ODT (75 mg rimegepant) per day.

How to take this medicine

Mygept® is for oral use.

The ODT can be taken with or without food or water.

Instructions to use:

Use dry hands, when opening the blister. Gently remove the ODT from the blister. Do not push the ODT through the foil.

As soon as the blister is opened, remove the ODT and place it under or on top of the tongue, where it will dissolve. No drink or water is needed.

Do not store the ODT outside the blister for future use.

If you take more Mygept® than you should

Talk to your doctor or pharmacist or go to a hospital straight away. Take the medicine pack and this leaflet with you.

If you forget to take Mygept®

If you take Mygept® for the prevention of migraine and you miss a dose, just take the next dose at the usual time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop using Mygept® and contact your doctor straight away if you have signs of an allergic reaction such as severe rash or shortness of breath. Allergic reactions with Mygept® are uncommon (may affect up to 1 in 100 people).

A common side effect (may affect up to 1 in 10 people) is nausea.

5. How to store Mygept®

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date.
- Store below 30°C.
- Store in the original package in order to protect from moisture.
- Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

What Mygept® contains

The active substance is rimegepant (as sulfate). The other ingredients are microcrystalline cellulose, croscopovidone, pregelatinized starch, directly compressible starch, colloidal silicone dioxide, sucralose, sweet mint flavor, lemon flavor, vanilla aroma flavor, magnesium stearate and purified water.

Each Mygept® ODT contains 75 mg rimegepant (as sulfate).

What Mygept® looks like and contents of the pack

Mygept® ODT come in three different pack sizes:

- Each 2 ODT are in a blister and each blister is packed in a box with a leaflet.
 - Each 4 ODT are in a blister and each blister is packed in a box with a leaflet.
 - Each 8 ODT are in a blister and each blister is packed in a box with a leaflet.
- Not all pack sizes may be marketed.

Last revision: November 2025



Manufactured by Nano Fanavaran Darouei Alvand (NanoAlvand)

Address: W. 7th St., Simin Dasht Industrial Area, Karaj, Alborz, Iran.

Tel: +9826-36671187

Fax: +9826-36671187

E-mail: info@nanoalvand.com

URL: www.nanoalvand.com

OrchidLife (Consumer Support for NanoAlvand Products)

(24/7) +98 (21) 42593

هالچیت

ریمچانت

قرص بازشونده در دهان

پیش از شروع مصرف مایچیت® محتوای برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این برگه راهنما در بر گیرنده پاسخ شایع‌ترین سؤالات در مورد داروی مایچیت® است. در صورتی که پاسخ تمامی سؤالات شما در این برگه راهنما نیامده است، می‌توانید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. اطلاعات این برگه راهنما در تاریخی که در انتهای صفحه آمده است، به‌روزرسانی شده و ممکن است در بر گیرنده آخرین اطلاعات علمی در مورد داروی شما نباشد. برای اطلاع از آخرین داده‌های علمی در مورد داروی خود با پزشک یا داروساز مشورت کنید. همچنین برای دسترسی به آخرین ویرایش این برگه راهنما می‌توانید به وبسایت شرکت داروسازی نانوآلوند به آدرس www.nanoalvand.com مراجعه فرمایید.

مایچیت® چیست و در چه مواردی تجویز می‌شود؟

نام اختصاصی داروی شما مایچیت® و نام ژنریک آن ریمچانت است. این دارو فعالیت ماده‌ای به نام پپتید وایسته به ژن کلسی‌توین (CGRP) را در بدن مهار می‌کند. افراد مبتلا به میگرن ممکن است سطح CGRP بالایی داشته باشند. ریمچانت به گیرنده CGRP متصل می‌شود و توانایی CGRP را برای اتصال به گیرنده کاهش می‌دهد. این امر فعالیت CGRP را کاهش داده و دو اثر دارد:

(۱) توقف حمله فعال میگرن

(۲) کاهش تعداد حملات میگرن در صورت مصرف پیشگیرانه

مایچیت® برای درمان و پیشگیری از حملات میگرن در بزرگسالان استفاده می‌شود.

مایچیت® به صورت قرص بازشونده در دهان (ODT) طراحی شده است که بلافاصله در دهان حل می‌شود و می‌توان آن را بدون نیاز به آب یا غذا به راحتی مصرف کرد.

این دارو ممکن است در مواردی که در این برگه راهنما ذکر نشده است نیز تجویز شود. در صورتی که در مورد علت تجویز و نحوه عملکرد آن سؤالی دارید، از پزشک خود بپرسید.

چه افرادی نباید مایچیت® را دریافت کنند؟

- اگر سابقه واکنش حساسیتی به ریمچانت یا مواد جانبی موجود در مایچیت® را دارید. (لیست این مواد در قسمت آخر برگه راهنما آمده است).

پیش از دریافت مایچیت® یا در طول درمان با آن چه مواردی را حتماً باید به پزشک خود اطلاع دهید؟

پیش از مصرف مایچیت®، در صورتی که هر یک از موارد زیر در مورد شما صدق می‌کند، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- اگر به مشکلات شدید کبدی مبتلا هستید.

- اگر عملکرد کلیه شما کاهش یافته است یا تحت دیالیز کلیه قرار دارید.

در طول درمان با مایچیت®، در صورت بروز هر یک از علائم زیر مصرف دارو را متوقف کرده و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:

- بروز هر گونه علائم واکنش حساسیتی مانند اختلال در تنفس یا بشورات شدید پوستی. این علائم ممکن است چند روز پس از مصرف ظاهر شوند.

آیا مایچیت® در کودکان و نوجوانان قابل تجویز است؟

مایچیت® نباید در کودکان و نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال تجویز شود؛ زیرا تاکنون مصرف آن در این گروه سنی بررسی نشده است.

آیا مایچیت® با سایر داروها تداخل دارد؟

بسیاری از داروها ممکن است با مایچیت® تداخل داشته باشند؛ لذا در صورتی که در حال مصرف هر نوع دارویی اعم از داروهای نسخه‌ای، بدون نسخه، فرآورده‌های طبیعی، گیاهی و ویتامین‌ها هستید، اخیراً دارویی مصرف کرده و یا حتی قصد مصرف دارویی را دارید، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید، زیرا برخی داروها ممکن است بر اثربخشی مایچیت® تأثیر بگذارند یا برعکس، مایچیت® ممکن است بر اثربخشی سایر داروها تأثیر بگذارد.

از مصرف همزمان مایچیت® با داروهای زیر خودداری کنید:

- اپتاکونازول و کلاریترومایسین (داروهای مورد استفاده در درمان عفونت‌های قارچی یا باکتریایی)

- ریتوناویر و افانیریز (داروهای مورد استفاده در درمان عفونت HIV)

- بوستنان (داروی مورد استفاده در درمان پرفشاری خون)

- گیاه علف چای یا St. John's Wort (یک فرآورده گیاهی که در درمان افسردگی کاربرد دارد).

- فنوباریتال (داروی مورد استفاده در درمان صرع)

- ریفاکسیم (داروی مورد استفاده در درمان سل یا تب مالت)

- مدافینیل (داروی مورد استفاده در درمان نازکولپسی)

از مصرف مایچیت® بیش از یک بار در هر ۴۸ ساعت همراه با داروهای زیر خودداری کنید:

- فلوکنازول و اریترومایسین (داروهای مورد استفاده در درمان عفونت‌های قارچی یا باکتریایی)

- دیلتیازم، کینیدین و وراپامیل (داروهای مورد استفاده در درمان ریتم غیر طبیعی قلب، درد قفسه سینه (آنژین) یا پرفشاری خون)

- سیکلوسپورین (داروی مورد استفاده برای جلوگیری از رد پیوند عضو)

ایمنی مصرف مایچیت® در دوران بارداری و شیردهی چگونه است؟

بارداری

اگر در دوران بارداری هستید، فکر می‌کنید که ممکن است باردار باشید یا قصد باردار شدن دارید، پیش از شروع مصرف مایچیت® با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

از آنجایی که اثرات ریمچانت در زنان باردار مشخص نیست. بهتر است از مصرف مایچیت® در دوران بارداری خودداری نمایید.

شیردهی

اگر در حال شیردهی هستید یا قصد شیردهی دارید، پیش از شروع مصرف مایچیت® با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. شما و پزشکتان باید در مورد مصرف مایچیت® در دوران شیردهی تصمیم بگیرید.

آیا در طول مدت مصرف مایچیت® رانندگی و کار با ماشین‌آلات مجاز است؟

انتظار می‌رود مایچیت® تأثیری بر توانایی رانندگی و کار با ماشین‌آلات نداشته باشد.

دوز، فواصل تجویز و طول دوره درمان با مایچیت® چقدر است؟

مایچیت® را دقیقاً طبق دستور پزشک یا داروساز خود مصرف کنید. در صورت عدم اطمینان از نحوه مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

میزان مصرف

- پیشگیری از میگرن: دوز توصیه شده یک قرص ۷۵ میلی‌گرمی، به صورت یک روز در میان است.

- درمان حمله میگرنی پس از شروع آن: دوز توصیه شده یک قرص ۷۵ میلی‌گرمی در صورت نیاز است؛ مایچیت® نباید بیش از یک بار در روز مصرف شود.

حداکثر دوز روزانه، یک قرص بازشونده در دهان (حاوی ۷۵ میلی‌گرم ریمچانت) در روز است.

نحوه مصرف مایچیت® چگونه است؟

مایچیت® برای مصرف خوراکی است.

مایچیت® را می‌توان با یا بدون غذا یا آب مصرف کرد.

نحوه مصرف

هنگام باز کردن پلیستر، دست‌ها باید خشک باشند. قرص را به آرامی خارج کنید. نباید قرص را به داخل فویل فشار دهید.

به محض باز کردن پلیستر، قرص را بیرون آورده و زیر یا روی زبان قرار دهید تا حل شود و سپس آن را قورت دهید. نیازی به نوشیدن آب یا سایر مایعات نیست.

از نگهداری قرص‌ها، خارج از پلیستر و برای دفعات بعدی مصرف خودداری کنید.

در صورت مصرف بیش از حد مایچیت® چه باید کرد؟

اگر مایچیت® را بیش از میزان تجویز شده مصرف کردید، بلافاصله به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید و یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه نمایید. بسته دارو و برگه راهنما را نیز همراه خود ببرید.

در صورت فراموشی مصرف مایچیت® چه باید کرد؟

اگر مایچیت® را برای پیشگیری از میگرن مصرف می‌کنید و یک دوز را فراموش کردید، دوز بعدی را در زمان معمول مصرف نمایید. از دو برابر کردن دوز دارو برای جبران دوز فراموش شده، خودداری کنید.

در صورت داشتن سؤالات بیشتر در رابطه با مصرف مایچیت®، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

مایچیت® ممکن است چه اثرات نامطلوبی داشته باشد؟

مایچیت® نیز مانند سایر داروها می‌تواند موجب بروز عوارض ناخواسته شود. هر چند این عوارض در همه افراد مصرف‌کننده بروز نخواهد کرد.

در صورت مشاهده علائم واکنش حساسیتی، مانند بشورات شدید پوستی یا تنگی نفس، مصرف مایچیت® را قطع کرده و فوراً با پزشک خود تماس بگیرید. واکنش‌های حساسیتی با مصرف ریمچانت، غیر شایع است (با شیوع بین ۰/۱٪ تا ۱٪).

یک عارضه شایع مصرف ریمچانت (با شیوع بین ۱٪ تا ۱۰٪)، حالت تهوع است.

عوارضی که در اینجا نام برده شده است، شامل همه عوارض مایچیت® نمی‌شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از پزشک یا داروساز خود کمک بگیرید.

مایچیت® را در چه شرایطی باید نگهداری کرد؟

- دارو را دور از دید و دسترسی کودکان نگهداری نمایید.

- مایچیت® نباید بعد از تاریخ انقضای که بر روی آن درج شده است، مصرف شود.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

- جهت محافظت از رطوبت، مایچیت® را تا زمان مصرف در بسته‌بندی اصلی نگهداری نمایید.

- هیچ دارویی را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دفع نکنید. از داروساز خود در مورد شیوه صحیح دفع داروهایی که دیگر استفاده نمی‌کنید، سؤال کنید. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

مایچیت® از چه اجزایی تشکیل شده است و بسته‌بندی آن چگونه است؟

در این فرآورده از ریمچانت (به صورت سولفات) به عنوان ماده مؤثره و از میکروکریستالین سلولز، کراس پوئیدون، نشاسته پری‌ژلاتینه، نشاسته directly compressible، کولئیدال سیلیکون دی‌اکساید، سوکralوز، طعم‌دهنده نعناع شیرین، طعم‌دهنده لیمو، طعم‌دهنده وانیل، منیزیم استئارات و آب تصفیه‌شده به عنوان مواد جانبی استفاده شده است.

هر قرص بازشونده در دهان مایچیت®، حاوی ۷۵ میلی‌گرم ریمچانت (به صورت سولفات) می‌باشد.

قرص بازشونده در دهان مایچیت® در سه نوع بسته‌بندی تولید می‌شود:

- هر ۲ عدد قرص بازشونده در دهان مایچیت® در یک پلیستر و هر پلیستر به همراه یک برگه راهنما در یک جعبه بسته‌بندی می‌شود.

- هر ۴ عدد قرص بازشونده در دهان مایچیت® در یک پلیستر و هر پلیستر به همراه یک برگه راهنما در یک جعبه بسته‌بندی می‌شود.

- هر ۸ عدد قرص بازشونده در دهان مایچیت® در یک پلیستر و هر پلیستر به همراه یک برگه راهنما در یک جعبه بسته‌بندی می‌شود.

ممکن است همه بسته‌بندی‌ها همزمان در بازار وجود نداشته باشند.

تاریخ آخرین بازنگری: نوامبر ۲۰۲۵ برابر با آبان ۱۴۰۴



ساخت شرکت نانوفانوران دارویی الوند (نانوالوند)

آدرس: ایران، البرز، کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم غربی

تلفن: ۰۲۶-۳۶۶۷۱۱۸۷

فکس: ۰۲۶-۳۶۶۷۱۱۸۷

پست الکترونیکی: info@nanoalvand.com

وبسایت: www.nanoalvand.com

ارکیدیلاف (حامی مصرف‌کنندگان محصولات شرکت نانوالوند)

۰۲۱-۴۲۵۹۳ (۲۴/۷)